



Beschaffung von Bienen

Bezugsmöglichkeiten

In der Regel sind in der Region genügend Anbieter von Bienenvölkern vorhanden.

Örtlichen Imkerorganisationen (Vereine, Kreisverbände, Lehrbienenstände) bieten oftmals auch **Bienenmärkte** zu bestimmten Terminen oder **Bienenbörsen** an, über die Wirtschaftsvölker, Ableger aber auch Königinnen zu beziehen sind!

Oftmals werben Vereine auch mit einem kostenlosen **Willkommensvolk**. Auch hier lohnt sich nachfragen

In den Fachzeitschriften befinden sich **Verkaufsanzeigen** von Imkereien, die ebenfalls Bienen anbieten. Es sollte jedoch auch hier auf regionale Herkünfte geachtet werden.

 **Importbienen sind wegen Gefahr von Krankheiten, die eingeschleppt werden können, nicht zu empfehlen!**

Bienenschwärme können auch selbst gefangen werden. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind diese herrenlos, wenn sie nicht mehr von einem Imker verfolgt werden. Hierzu dürfen auch fremde Grundstück betreten werden. Der entstandene Schaden ist jedoch zu ersetzen. Bei fremden Schwärmen ist jedoch besonders auf die Gesundheit zu achten!

Anzahl

Bienen machen Arbeit! Um eine Überforderung zu vermeiden, werden nachfolgend – insbesondere für Neueinsteiger - Völkerzahlen für die entsprechende Zielsetzung genannt. Diese sind lediglich als Orientierung zu verstehen.

- Einstieg: 3 - 5 Einheiten
- Hobby: bis circa 30
- Nebenerwerb: bis ca. 150 Einheiten
- Haupterwerb: ab ca. 150 Einheiten

Anschrift

Angebot

Um gerade am Anfang nicht gleich das Überwinterungsrisiko zu haben, empfiehlt es sich Völker im Frühjahr zu kaufen. **Ableger und Kunstschwärme aus dem Vorjahr** entwickeln in der folgenden Saison bereits ihre volle Leistung und bringen – wenn Sie eine junge Königin haben – auch weniger Probleme bezüglich Krankheiten und Schwarmtrieb mit sich!

Preislich am günstigsten sind **Ableger aus dem aktuellen Jahr**. Diese müssen aber im Spätsommer über eine entsprechende Einwinterungsstärke verfügen. Beim Kauf sollten deshalb Anfang Mai mindestens 3 Brutwaben im Juni etwa 6 und Juli etwa 10 Waben (Zandermaß) gut besetzt sein. Ableger müssen in der Regel in der laufenden Saison noch gefüttert werden und bringen noch keinen wesentlichen Honigertrag.

Qualität der Völker

Gute Völker sollten gesund (siehe nächster Abschnitt) sein und über günstige Eigenschaften verfügen. Von Bedeutung sind unter anderem:


Sanftmut:	Bienen sollten friedlich sein und bei normalen Bedingungen auch ohne Schutzkleidung geöffnet werden können
Wabensitz:	Bienen sollen möglichst ungestört auf den Waben sitzen bleiben und nicht herunterlaufen oder Anhäufungen bilden.
Schwarmtrieb:	Die Völker sollten möglichst selten schwärmen wollen und durch einfache Gegenmaßnahmen (einmaliges Zellen brechen) wieder ihren Schwarmtrieb aufgeben.
Honigertrag	Die Völker sollten viel Honig bringen. Der bayerische Durchschnitt liegt derzeit bei circa 20 bis 25 Kilogramm pro Volk und Jahr.
Krankheitsanfälligkeit	Bienenvölker sollten keine Krankheiten haben und eine hohe Toleranz bezüglich Parasiten aufweisen. Dies ist wichtiger Gegenstand der aktuellen Zuchtbemühungen.

Für diese Eigenschaften ist die Königin als alleiniges Muttertier verantwortlich. Deshalb müssen alle Verkaufszüchter, die mehr als 50 Königinnen pro Jahr verkaufen, Königinnen aus ihrem Betrieb zur staatlichen Leistungsprüfung bringen. Die Ergebnisse dieses „Warentests“ werden jährlich im Internet (www.lwg.bayern.de) und in den Fachzeitschriften veröffentlicht.

Auskunft erhalten sie auch bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau und ihren staatlichen Fachberatern für Bienenzucht

Die Ergebnisse des Vergleichs werden in einer Grafik dargestellt. Alle Herkünfte deren Balken im Diagramm nach rechts zeigen, bewegen sich über dem Durchschnitt.

Abbildung 4: Prüfmerkmal "Schwarmtrieb" (LP 2002/2003)



Ob eine Königinnenherkunft gut oder schlecht ist, richtet sich in erster Linie nach der Strenge der Auslese des Züchters. Die Bienenrasse spielt hierbei nur eine untergeordnete Rolle.

Dennoch sollte wegen der Beeinflussung der natürlichen Begattung eine Rasse gewählt werden, die auch in der Nachbarschaft vertreten ist.

Die weiteste Verbreitung hat in Bayern die Carnica-Biene (auch: Kärntnerbiene/*Apis mellifera carnica* /Graue Biene). Ursprünglich heimisch war hingegen die Dunkle Biene (auch: *Mellifera* /*Apis mellifera mellifera*/Nordbiene), die jedoch immer stärker zurückgedrängt wurde. Eine Verbreitung hat auch die Buckfast-Biene. Diese ist ein Rassehybrid der Art *Apis mellifera* mit Ursprung im Buckfastkloster, Südengland. .

Grundsätzlich sollte im neuen Volk eine junge Königin sein. Zu erkennen ist dies an den Begleitpapieren oder an der Farbe der Königinnenzeichnung. Je nach Schlupfjahr werden den Königinnen abwechselnd einen weißen, gelben, roten, grünen oder blauen Punkt aufgeklebt. Im Jahr 2006 erhielten alle neuen Königinnen einen weißen Punkt.


Gesundheit

Neue Bienenvölker dürfen nicht aus einem Sperrgebiet aufgrund einer Bienenseuche (Faulbrutgebiet) stammen. Deshalb ist beim Kauf eine Bescheinigung vom Herkunftslandratsamt zu fordern. Diese erhält der Verkäufer auf Anfrage bei seinem zuständigen Amtstierarzt.

Da eine Gesundheitsbescheinigung keine Untersuchung am Bienenvolk erfordert, sollte jedoch auch selbst ein Blick in das Volk geworfen werden. Auffällige Krankheiten kann man auch als Anfänger relativ einfach feststellen.

Brutkrankheiten erkennt man am häufigsten an einem lückigen Brutnest

Bei Verdauungskrankheiten sind oftmals Kotspritzer auf den Waben und am Flugloch zu sehen.



Vor Importbienen wird aufgrund der möglichen Einschleppung von Krankheiten abgeraten!

Fängt man fremde Schwärme selbst, sollten diese zur Krankheitsvorsorge in Dunkelhaft (Keller) gegeben werden. Wenn die ersten Bienen von der Traube fallen, sind mögliche Krankheitserreger in der Honigblase durch die Verdauung unschädlich gemacht worden. Dies kann – je nachdem wie lange der Schwarm bereits schon unterwegs ist – bis zu drei Tage dauern. Die Schwärme muß man danach in der Regel füttern. Weiterhin ist eine Aufstellung an einen isolierten Standplatz (Quarantäne-Stand) sinnvoll, um die Ansteckungsgefahr mit anderen Infektionskrankheiten zu reduzieren.

