

















































**Tabelle 1: Fotodokumentation der Gartenleistung in Herbst und Winter**

<p>Abelia grandiflora 'Kaleidoscope' (Kientzler)</p>	<p>Kühle Nächte intensivieren Laubzeichnung, gelbe Blattflächen werden orange, ab KW 06 Spitzen teilweise bräunlich und welk</p>		
			
<p>KW 37</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 07</p>
<p>Acorus gramineus 'Ogon' (Kientzler)</p>	<p>2016 im Gewächshaus Spinnmilbenbefall, ab KW 06 im Freiland vereinzelt braune Halmspitzen</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Ajuga reptans 'Burgundy Glow' (Volmary)</p>	<p>Ab KW 41 Beginn Rotfärbung und erste Blüten, ab KW 45 Laub kräftig burgunderrot bis violett, ab KW 49 erste braune Blätter, ab KW 51 mehrere Triebspitzen und Blätter braun, ab KW 05 Laub unansehnlich, abgestorben</p>		
			
<p>KW 31</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 01</p>
<p>Bergenia 'Eroica' (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 45 beginnende Laubfärbung, ab KW 47 Laub dunkel purpur, ab KW 05 Blätter z.T. eingerollt, ab KW 11 vereinzelt Blattrandnekrosen, blüht ab KW 12</p>		
			
<p>KW 31</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 47</p>	<p>KW 14</p>

















<p><i>Calocephalus brownii</i> (Kientzler)</p>	<p>KW 41 runder, kompakter Wuchs, ab KW 03 erste schwärzliche Flecke, ab KW 08 vermehrte Fleckung</p>		
			
<p>KW 37</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 11</p>
<p><i>Carex buchananii</i> 'Red Rooster' (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 43 beginnen Halme sich zu locken, KW 11 Halme entfärbt</p>		
			
<p>KW 36</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 11</p>
<p><i>Carex comans</i> 'Amazon Mist' (Kientzler)</p>	<p>Wächst kräftig, überhängend, verdeckt schnell andere Kombinationspartner, ab KW 45 zunehmende Locken an den Halmspitzen, ab KW 11 Halme gelb.</p>		
			
<p>KW 36</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 11</p>
<p><i>Carex hachijoensis</i> 'Eversheen' (Kientzler)</p>	<p>Wächst zierlich, kann sich trotzdem behaupten, ab KW 7 vereinzelt braune Halmspitzen</p>		
			
<p>KW 36</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>



















<p>Carex morrowii 'Ice Dance' (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 49 oberes Halmdrittel bräunlich, ab KW 05 viele Halme fahl bis braun, ab KW 11 alle Halme gelbbraun, Neuaustrieb gesund</p>		
			
<p>KW 31</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>
<p>Carex panicea (Kientzler)</p>	<p>Kompaktes Gras mit blaugrünen Halmen, neigt zu braunen Halmspitzen, ab KW 05 vermehrt gelbe Halme.</p>		
			
<p>KW 36</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 47</p>	<p>KW 05</p>
<p>Carex petriei 'Bronze Form' (Kientzler)</p>	<p>Rotbraune Halme, aufrechter Wuchs, Farbe wird im Laufe des Winters intensiver, ab KW 07 bleichen die Halme aus</p>		
			
<p>KW 31</p>	<p>KW 43</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 11</p>
<p>Cheilanthes lanosa 'Cimbra'</p>	<p>Auf Beet ausgepflanzt: Ab KW 03 Blätter stark eingerollt, ab KW 05 zum Teil braun, treibt im Frühjahr zum großen Teil wieder aus.</p>		
			
<p>KW 43</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 11</p>


















<p><i>Choisya ternata</i> "White Dazzler" (Kientzler)</p>	<p>Hellgrünes Laub, filigraner Wuchs, keine Blüte, ab KW 03 z.T. leichte Kälteschäden (glasiges Laub), überlebt gut auf dem Beet.</p>		
			
<p>KW 39</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 11</p>	<p>KW 24 (Beet)</p>
<p><i>Corynephorus canescens</i> 'Spiky Blue' (Syngenta/Floripro)</p>	<p>Etwas empfindlich auf Nässe in der Anzucht, zarte, sehr dichte graue Halme, ab KW 03 vermehrt gelbliche Halme, ab KW 07 komplett gelb</p>		
			
<p>KW 37</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 07</p>
<p><i>Cyrtomium fortunei</i> 'Clivicola' (Volmary)</p>	<p>Ab KW 47 braune Blattspitzen, ab KW 03 einzelne Blätter ganz rotbraun, überlebt gut auf dem Beet</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 11</p>	<p>KW 24</p>
<p><i>Dryopteris erythrosora</i> 'Autumn' (Volmary)</p>	<p>Bis KW 47 einzelne Blätter bronzefarben, ab KW 47 zum Teil vertrocknete Blattspitzen, treibt im Frühjahr frischgrün wieder aus.</p>		
			
<p>KW 36</p>	<p>KW 43</p>	<p>KW 47</p>	<p>KW 24</p>



















<p>Erysimum linifolium 'Variegatum Peach' (Florensis)</p>	<p>Schöner Blattschmuck, KW 49 fällt auseinander, nach Frost legt die Pflanze die Blätter an, KW 07 Pflanze zusammengebrochen.</p>		
 <p>KW 32</p>	 <p>KW 41</p>	 <p>KW 51</p>	 <p>KW 07</p>
<p>Euphorbia 'Helena' (Kientzler)</p>	<p>KW 45 intensive Rotfärbung, ab KW 49 Umbiegen der Triebspitzen, KW 03 alle Triebe umgebogen, wirken erfroren, KW 07 Triebe braun, weich</p>		
 <p>KW 37</p>	 <p>KW 45</p>	 <p>KW 49</p>	 <p>KW 05</p>
<p>Festuca 'Azurit' (Kientzler)</p>	<p>Fällt ab KW 51 etwas auseinander, ab KW 07 einzelne braune Halmspitzen.</p>		
 <p>KW 41</p>	 <p>KW 51</p>	 <p>KW 07</p>	 <p>KW 11</p>
<p>Festuca scoparia 'Green Form' (Kientzler)</p>	<p>Wächst überhängend, behält den ganzen Winter über Farbe und Form, ab KW 05 zunehmend einzelne gelbe Halme</p>		
 <p>KW 41</p>	 <p>KW 51</p>	 <p>KW 07</p>	 <p>KW 11</p>



















<p>Hebe 'Magicolor Frozen Flame' (Köder)</p>	<p>Zunehmende Färbung bei kühlen Temperaturen, ab KW 03 beginnen sich ältere Blättchen braun zu färben, KW 11 ganze Pflanze braun</p>		
			
<p>KW 38</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Hedera helix 'Anita' (Kientzler)</p>	<p>Kleinlaubig, buschiger Wuchs,. Bis ins Frühjahr Laub gesund.</p>		
			
<p>KW 38</p>	<p>KW 43</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 11</p>
<p>Hedera helix 'Asterisk' (Kientzler)</p>	<p>Stängel mit längeren Internodien, die Internodien werden im Laufe des Winters immer länger, Laub bis KW 11 gesund</p>		
			
<p>KW 36</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 07</p>
<p>Hedera helix 'Glacier' (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 51 Verdrehung der Blätter, ab Kw 05 Verbrennungen auf dem Laub, KW 11 viele Blätter vertrocknet.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>



<p>Hedera helix 'Mutation aus Yellow Ripple' (Kientzler)</p>	<p>Leuchtendes Gelbgrün, ab KW 05 leichter Sonnenbrand am Laub, KW 11 viele Blätter verdreht oder vertrocknet.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>
<p>Hedera helix 'Tear Drop' (Kientzler)</p>	<p>Attraktive, kleine Blattform, mittelstark wachsend, ab KW 7 leichte Blattverdrehungen</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Hedera helix 'Yellow Ripple' (Kientzler)</p>	<p>KW 41 noch dicht besetzt, später werden Internodien länger, Blätter verdrehen sich und wirken vertrocknet.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Heuchera 'Amber Lady' (Kientzler)</p>	<p>Große Blätter, ab KW 01 etwas schlaff</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 11</p>



















<p>Heuchera 'Amethyst Mist' (Kientzler)</p>	<p>Große Blätter, ab KW 05 ältere Blätter zunehmend schlaff, KW 11 Blattrandnekrosen.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Heuchera 'Apple Crisp' (Kientzler)</p>	<p>Bleibt kompakt, ab KW 05 Blätter leicht schlaff, KW 11 sehr starke Blattrandnekrosen.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 49</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Heuchera 'Frosted Flame' (Kientzler)</p>	<p>KW 41 Verbrennungen am Laub, Ab KW 03 Laub zunehmend schlaff</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 05</p>
<p>Heuchera 'Little Cuties Blondie in Lime' (Kientzler)</p>	<p>KW 41 in Blüte, kühle Nächte intensivieren die Laubzeichnung, KW 47 abgeblüht, ab KW 49 Laub wird immer rötlicher, übersteht Frost besser als andere Sorten mit nur leichtem Einrollen der Blätter</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 07</p>



















<p>Heuchera 'Marmalade' (Kientzler)</p>	<p>Guter Kontrast durch violette Blattunterseite. Ab KW 03 wird das Laub zunehmend schlaff und ansehnlich. Neuer frischer Austrieb in KW 11.</p>		
<p>KW 41</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 11</p>
<p>'Heuchera 'Red Fury' (Kientzler)</p>	<p>Kühle Nächte intensivieren Laubfarbe. Nach Frost werden Blätter schlaff und verdreht.</p>		
<p>KW 43</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 07</p>
<p>Heuchera 'Season's King' (Kientzler)</p>	<p>KW 41 leichte Laubverbrennungen. Ab KW 03 schlaffe, verdrehte Blätter, ab KW 11 Blattrandnekrosen.</p>		
<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>
<p>Heuchera 'Silver Duke' (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 51 Blätter verdreht, KW 11 frischer, gesunder Neuaustrieb.</p>		
<p>KW 41</p>	<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 11</p>



















<p>Heuchera 'Starry Night' (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 45 einzelne Blütenknospen, die aber nicht mehr aufgehen. Ab KW 03 Einrollen und Verdrehen der Blätter. Blätter schlaff.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 45</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 07</p>
<p>Heuchera 'Sugar Frosting' (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 51 zunehmendes Verdrehen der Blätter, leichte Brennflecken</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 07</p>
<p>Heuchera 'Timeless Orange' (Kientzler)</p>	<p>Ohne Hemmstoffe etwas lange Blattstiele, schöner Kontrast von braun-rottem Laub und violetter Blattunterseite, der sich im Laufe des Winters verstärkt. Ab KW 03 ältere Blätter schlaff..</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>
<p>Iberis 'Candy Ice' (Kientzler)</p>	<p>Wächst langsam, nicht mit zu konkurrenzstarken Partnern zusammenpflanzen, als Blattschmuck den ganzen Winter über attraktiv, blüht weiß ab Anfang April bis Mitte Mai</p>		
			
<p>KW 45</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>	<p>KW 20</p>



<p>Lavandula lanata (Kientzler)</p>	<p>Silbrige Blattschmuckpflanze, ab KW 03 leichte Verfärbung und Verdrehung, aber noch ansehnlich.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 07</p>
<p>Lonicera 'Lemon Queen' (Kientzler)</p>	<p>Blattschmuck mit grün-gelben Blättchen, den ganzen Winter ansprechendes Äußeres</p>		
			
<p>KW 37</p>	<p>KW 43</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 07</p>
<p>Muehlenbeckia complexa (Kientzler)</p>	<p>Ab KW 01 färben sich die Blättchen erst mattgrün, dann braun.</p>		
			
<p>KW 43</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 07</p>
<p>Rumex sanguineus 'Bloody Dock' (Kientzler)</p>	<p>Wächst in Kombinationen sehr stark, Laub wird nach stärkeren Frösten schnell unansehnlich, treibt im Frühjahr neu durch und geht dann schnell in Blüte.</p>		
			
<p>KW 47</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 24</p>



















<p>Santolina chamaecyparissus (Kientzler)</p>	<p>Ansehnlich bis Woche 1. Ab KW 03 zunehmende Braunfärbung der Blättchen, Blättchen hängen wie Lametta herunter.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Sedum album 'Coral Carpet' (Volmary)</p>	<p>Bleibt sehr lange immergrün, vereinzelt kahle Stängel in der Mitte, färbt sich ab KW 11 leuchtend rot.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>	<p>KW 11</p>
<p>Sedum anopetalum 'Green Ball' (Kientzler)</p>	<p>Eines der besten Sedum für den Winter: bleibt bis ins Frühjahr dicht besetzt, ab KW 07: Blättchen bekommen rote Spitzen.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 47</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>
<p>Sedum pachyclados 'Opal' (Florensis)</p>	<p>Schon ab KW 47 Gelbfärbung der älteren Blätter, geht ab KW 51 in braun über. Später verkahlen die Stängel, ab KW 11 Neuaustrieb.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 47</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 07</p>



<p>Sedum reflexum 'Blue Cushion' (Kientzler)</p>	<p>Laub bläulicher als 'Green Ball'. Neigt im Laufe des Winters zum Verkahlen. Ab KW 11 neuer Durchtrieb.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Sedum reflexum 'Yellow Cushion' (Kientzler)</p>	<p>Neigt im Laufe des Winters zum Verkahlen, ab KW 11 neuer Durchtrieb.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 51</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Sedum sexangulare (Kientzler)</p>	<p>Dichte grüne Polster, färben sich ab KW 05 zunehmend rötlich.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 49</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 11</p>
<p>Sedum spurium 'Tricolor' (Kientzler)</p>	<p>Verkahlt sehr stark im Laufe des Winters.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 47</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 11</p>



<p><i>Sedum tetractinum</i> (Kientzler)</p>	<p>Ältere Triebe werden nach Frost braun und matschig. Es erfolgt aber immer wieder frischer Durchtrieb.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 49</p>	<p>KW 05</p>	<p>KW 07</p>
<p><i>Stachys byzantina</i> <i>Silver Carpet'</i> (Kientzler)</p>	<p>Große samtige Blätter, die nach ersten Frostnächten braun und unansehnlich werden.</p>		
			
<p>KW 45</p>	<p>KW 49</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>
<p><i>Thymus serpyllum</i> <i>'Purple Beauty'</i> (Kientzler)</p>	<p>Kriechend wachsender Thymian. Laub färbt sich ab KW 05 leuchtend purpurrot, vergrünt im Frühjahr wieder, blüht im Sommer purpurfarben, Gute Bienenweide.</p>		
			
<p>KW 45</p>	<p>KW 01</p>	<p>KW 07</p>	<p>KW 11</p>
<p><i>Thymus vulgaris</i> <i>'Faustinoi'</i> (Selecta One)</p>	<p>Behält den ganzen Winter über Farbe und Form.</p>		
			
<p>KW 41</p>	<p>KW 03</p>	<p>KW 11</p>	<p>KW 14</p>