



Wuchshemmung bei Pericallis 2010/11

Hubert Hanke, LWG, 1/2013

Versuchsglieder:

Faktor A: Pericallis - Sorten

1. Senetti Deep Blue (Kientzler)
2. Senetti Magenta Bicolor (Kientzler)

Faktor B: Wuchshemmstoffbehandlungen

alle mit 100 ml/m² spritzen (1000 l/ha),

1. Behandlung: 2 Wochen nach dem Stutzen = 14.12.

2. Behandlung: 23.12

1. ohne
2. 2 x Carax 0,14 % (1,4 l/ha)
3. 2 x CCC 720 0,1 % mit Wuxal 0,1 % (1 l/ha + 1 l/ha)
4. Regalis 0,15 % + Regalis 0,1 % (1,5 bzw. 1,0 kg/ha) mit enthärtetem Wasser
5. Regalis 0,25 % (2,5 kg/ha) mit enthärtetem Wasser
+ Tilt 0,012 % (0,12 l/ha)
6. 4 x Caramba 0,05 % (0,5 l/ha)

Wiederholungen: 3

Kultur: Topfen: 10.11. 12/14 °C in T12 mit ED 73 SM (pH 5,5 + Fe)
18.11. 10/12 °C
Stutzen: 30.11.

Ergebnis Zusammenfassung:

Behandlung Nr.	Behandlung	Hemmwirkung	Bemerkung
1	ohne		
2	2 x Carax 0,14 %	schwach	
3	2 x CCC 720 0,1 % mit Wuxal 0,1 %	schwach	
4	Regalis 0,15 % + Regalis 0,1 %	deutlich	Laub kompakt, Blütenstiele darüber lang
5	Regalis 0,25 % + Tilt 0,012 %	deutlich	Laub kompakt, Blütenstiele darüber lang
6	4 x Caramba 0,05 %	keine	