

Montag, 11. Mai 2026



## Entwicklung

BBCH 14-18

4- bis 8-Blatt-Stadium

Gescheine gut sichtbar



## Kulturmaßnahme

Ausbrechen/ Triebkorrektur

## Pflanzenschutz

Oidium

Peronospora – mögliche Primärinfektion

Applikationsbedingungen beachten

## Allgemeine Situation



Die am Wochenende herrschenden sommerlichen Temperaturen zusammen mit den Niederschlägen der letzten Woche waren für das Rebenwachstum sehr vorteilhaft. Die Vorhersage für diese Woche sieht einen deutlichen Temperaturrückgang zur Wochenmitte, der den Wuchsfortschritt verlangsamen könnte. Über Menge und Verteilung der gemeldeten Niederschläge kann einmal mehr keine einheitliche Prognose erstellt werden. Regionsübergreifend treten vermehrt Funde mit Pockenmilbenbefall auf.

## Pflanzenschutz



Achten Sie bei den anstehenden Behandlungen im Sinne der guten fachlichen Praxis auf Wetterbedingungen und Bodenverhältnisse.

Oidium: Ein Behandlungsbeginn ist ab dem 5-Blatt-Stadium ratsam, v.a. in Anlagen mit Vorjahresbefall. Ideale Bedingungen für Oidiuminfektionen liegen derzeit aufgrund der vorherrschenden tiefen Temperaturen nicht vor. Auch die weitere Prognose stuft laut Vitimeteo die Infektionsgefahr als gering ein.

Achten Sie dennoch beim Ausbrechen auf Zeigertriebe und melden Sie diese bitte eine der folgenden Stellen:

Rebschutzwart vor Ort, Weinbauring (09381-8467340) oder Amtl. Rebschutzdienst (0931-98013502)

Gegen Oidium werden Netzschwefelpräparate zur aktuellen Behandlung empfohlen

| Mittel, z.B.  | l oder kg/ 10.000m <sup>2</sup> LWF | Zulassungsnummer |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| NS Stulln     | <b>8,33</b>                         | 050006-00        |
| Thiovit Jet   | <b>6,00</b>                         | 050498-00        |
| Microthiol WG | <b>10,0</b>                         | 008467-00        |

Peronospora: Erste Bodeninfektionen können in der vergangenen Woche durch die gefallenen Niederschläge passiert sein. Waren diese erfolgreich, können zum Ende dieses Wochenendes erste Ölflecke sichtbar werden (Verlauf der Inkubationszeit s. [www.vitimeteo-by.de](http://www.vitimeteo-by.de)).

Empfohlene Präparate für eine anstehende Peronosporabehandlung

| Mittel, z.B.  | l oder kg/ 10.000m <sup>2</sup> LWF | Zulassungsnummer |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| Delan WG      | <b>0,44</b>                         | 004424-00        |
| Folpan 80 WDG | <b>0,89</b>                         | 024459-00        |

## Kulturmaßnahmen



### Stockarbeiten

Der Aufgabenschwerpunkt liegt in den kommenden Tagen auf den Ausbrecharbeiten. Doppeltriebe, Kümmertriebe und überzählige Triebe im verdichtungsgefährdeten Kopfbereich sind hierbei zu entfernen.

Sind die Triebe etwas länger können auch schon die untersten 3 Blätter entfernt werden, was im weiteren Verlauf für eine gute Durchlüftung der Traubenzone sorgt.