

BEIKRAUTKONTROLLE UND STOCKPUTZEN

Tab. 8: Empfohlene Herbizide im Weinbau

Stand Januar 2022

Präparate	Wirkstoff	Aufwand (l bzw. kg/ha)	Wassermenge (l/ ha).	Anwendung ab Standjahr	Wartezeit (Tage)	Bemerkungen
Blattherbizide						
diverse Glyphosate # systemisch	Glyphosat 360- 680 g/l	bis 5	100-300	ab 4.	30	nach Gebrauchs- anleitung der jeweiligen PSM
Herbizide mit Blatt- und/ oder Bodenwirkung (im Vorjahr einer Wiederbepflanzung keine Behandlung durchführen)						
Katana systemisch, Wurzel	Flazasulfuron 250 g/kg Boden- und Blattwirkung	0,150 bis 0,200	200-400	ab 4.	90	April bis Juni
Kerb Flo (hpts. Gräser)	Propyzamid 400 g/l Bodenwirkung	6,25	400- 1000	ab 2.	F	Anwendung ab Nov. bis Jan. bei hoher Bodenfeuchtigkeit und Temp. < 10° C
Präparate zum Abbrennen von Stockausschlägen (Stockputzen)						
Shark*	Carfentrazone 60 g/l	2 x 0,5 bzw. 1 x 1,0	200-500	ab 3.	F	nur Reihen- behandlung
Quick-down* + Toil	Pyraflufen 24,2 g/l + Rapsölmethylester 836 g/l	0,4 + 1,0	300-500	ab 3.	F	nur Reihen- behandlung
Beloukha	Pelargonsäure	16	200	bis 4.	F	8% Konzentration und gute Benetzung

Aufgrund der politisch-gesellschaftlichen Diskussion um den Wirkstoff Glyphosat wird ein Verbot bis Ende 2023 angestrebt!

Beachten Sie auch die Vorgaben der aktuellen Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung zum Einsatz glyphosathaltiger Produkte (siehe Kap1)!

* Einschränkung der behandelbaren Sorten

F keine Wartezeit