

## Einsatzzeitpunkte der Oidium-Präparate

Vorblüte	letzte Vorblüte	Abg. Blüte bis Trauben gehen in den Hang	um Traubenschluss	bis Abschluss
<i>Gewanne mit Oidiumproblemen 2020</i>				
Netzschwefel mit zug. AWM zw. 4-5kg/ha		Sercardis	Talendo (extra (G))	Topas
	Collis (A)			Systhane
	Prosper TEC			
	Vivando	Kusabi		
	Dynali (G)			
<i>Gewanne ohne Oidiumprobleme 2020</i>				
Netzschwefel mit zug. AWM zw. 4-5kg/ha			Talendo (extra (G))	Topas
				Systhane
	Talendo (extra (G))			
		Sercardis		
		Prosper TEC		
		Collis (A)		
		Vivando Kusabi		
		Dynali (G)		
Laubarbeiten zeitgerecht durchführen, Entblätterung kurz nach der Blüte				

zug. AWM = zugelassene Aufwandmenge

Wirkstoffgruppen werden durch verschiedene Farben gekennzeichnet

( ) bedeutet: Präparat enthält weitere Wirkstoffgruppe (Buchstabe = Kat. Tab. 3)

Wechseln der Wirkstoffgruppe bei jeder Spritzung!

Im Bereich „abgehende Blüte“ bis „Trauben gehen in den Hang“ ist bei jeder Behandlung eine andere Wirkstoffgruppe einzusetzen! Abstände an Entwicklung anpassen!