

Empfohlene Herbizide im Weinbau

Tab. 8:

Stand Januar 2021

Präparate	Wirkstoff	Aufwand (l bzw. kg/ha)	Wassermenge (l/ha).	Anwendung ab Standjahr	Wartezeit (Tage)	Bemerkungen
Blattherbizide						
diverse Glyphosate # systemisch	Glyphosat 360-680 g/l	2,65 bis 10	100-300	ab 4.	30	nach Gebrauchsanleitung der jeweiligen PSM
Herbizide mit Blatt- und Bodenwirkung (im Vorjahr einer Wiederbepflanzung keine Behandlung durchführen)						
Katana systemisch, Wurzel	Flazasulfuron 250 g/kg	0,150 bis 0,200	200-400	ab 4.	90	April bis Juni
Katana Duo	Flazasulfuron 13,3 g/kg Glyphosat 288 g/kg#	3,0	150-300	ab 4.	75	nur Reihenbehand- lung nach Auflaufen bis BBCH 15
Präparate zum Abbrennen von Stockausschlägen (Stockputzen)						
Shark*	Carfentrazone 60 g/l	2 x 0,5 bzw. 1 x 1,0	200-500	ab 3.	keine	nur Reihenbehandlung
Quick- down* + Toil	Pyraflufen 24,2 g/l + Rapsölmethylester 836 g/l	0,4 + 1,0	300-500	ab 3.	keine	nur Reihenbehandlung

Aufgrund der politisch-gesellschaftlichen Diskussion um den Wirkstoff Glyphosat wird ein Verbot bis Ende 2023 angestrebt!

* Einschränkung der behandelbaren Sorten